RECOMENDADO POR EL CDC

VACUNAS PARA ADOLESCENTES

EDADES

11-12 años

HPV[1] (2 dosis)

Meningitis ACWY (primera dosis)[2]

La tosferina

Gripe (annual)

COVID-19 (annual)



13-15 años

Ponerse al día con les vacunas faltantes

Gripe (annual)

COVID-19 (annual)



16 años

Refuerzo de vacuna Meningitis ACWY Booster

Meningitis B[2]

Gripe (annual)

COVID-19 (annual)

17-18 años

Refuerzo de vacuna Td cada 10 años

Gripe (annual)

COVID-19 (annual)

[1]La serie del VPH puede comenzar a los 9 años. Se recomienda ponerse al día con la vacunación hasta los 26 años.

[2]La vacuna MenACWY es una vacuna de dos dosis: la primera dosis se recomienda para las edades de 11 a 12 años y la segunda a los 16 años. La vacuna MenB también es una vacuna de dos dosis recomendada para las edades de 16 a 18 años. Es posible que pueda recibir una dosis de la vacuna MenABCWY, aprobada por la FDA en octubre de 2023, cuando las vacunas MenACWY y MenB estén indicadas en la misma visita a la clínica. Hable con su proveedor de atención médica sobre qué vacuna es la más adecuada para usted.

UNITY
United for adolescent vaccination

© 2024 Unity Consortium. Reservados todos los derechos. Para obtener más información, visite www.unity4teenvax.org

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades